

項目	リベルサス錠 3mg	リベルサス錠 7mg	リベルサス錠 14mg
製品名	リベルサス錠 3mg	リベルサス錠 7mg	リベルサス錠 14mg
剤形	楕円形、白色～淡黄色の錠剤、識別コード：3 novo	楕円形、白色～淡黄色の錠剤、識別コード：7 novo	楕円形、白色～淡黄色の錠剤、識別コード：14 novo
錠剤の性状	白色～淡黄色の楕円形の錠剤、長径 13.5mm、短径7.5mm、厚さ6mm、重量400.7mg	白色～淡黄色の楕円形の錠剤、長径 13.5mm、短径7.5mm、厚さ6mm、重量404.7mg	白色～淡黄色の楕円形の錠剤、長径 13.5mm、短径7.5mm、厚さ6mm、重量411.7mg
効能または効果	2型糖尿病治療	2型糖尿病治療	2型糖尿病治療
用法および用量	通常成人は1日1回3mgから開始し、4週間以上後に7mgに増量可能。効果が不十分なら14mgまで増量可能。	通常成人は1日1回7mg。効果が不十分な場合、14mgまで増量可能。	成人には1日1回14mgが最適。開始は3mgで、4週間後に7mg、その後14mgへ増量。
用法および用量に関連する注意	服用は空腹時、1日の最初の食事または飲水前にコップ半分の水(約120mL以下)と服用。30分以内の飲食を避ける。	服用は空腹時、1日の最初の食事または飲水前にコップ半分の水(約120mL以下)と服用。30分以内の飲食を避ける。	空腹時、最初の食事前にコップ半分の水と服用。服用後30分間の飲食を避ける。
重要な基本的注意	投与前に血糖、尿糖を定期的に検査し、3～4ヶ月間投与して効果が不十分なら治療変更検討。	定期的な血糖、尿糖検査が推奨され、効果が不十分な場合は治療変更を検討。	治療中は血糖、尿糖の検査が推奨され、3～4ヶ月間効果が不十分なら他治療へ変更。
禁忌	本剤の成分に過敏症の既往がある患者、重症感染症患者、妊婦等	本剤成分に対する過敏症、重症感染症、妊娠中の患者には禁忌。	過敏症の既往、重症感染症、1型糖尿病、妊娠中の方に禁忌。
副作用	低血糖、急性膵炎、胆石症、胃腸障害、脱水による腎障害リスクあり。	低血糖、急性膵炎、胆石症のリスクあり。	低血糖、胆石症、膵炎、胃腸障害などの副作用あり。
貯法・有効期間	室温保存、36ヵ月	室温保存、36ヵ月	室温保存、36ヵ月
承認番号	30200AMX00513000	30200AMX00514000	30200AMX00515000
販売開始年月	2021年2月	2021年2月	2021年2月
製造販売業者	ノボ ノルディスク ファーマ株式会社	ノボ ノルディスク ファーマ株式会社	ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
問い合わせ先	ノボケア相談室：0120-180363	ノボケア相談室：0120-180363	ノボケア相談室：0120-180363

項目	リベルサス錠 3mg	リベルサス錠 7mg	リベルサス錠 14mg
販売名	リベルサス 3mg tablets	リベルサス 7mg tablets	リベルサス 14mg tablets
用量	3mg	7mg	14mg
販売開始年月	2021年2月	2021年2月	2021年2月
保存条件	室温保存	室温保存	室温保存
有効期間	36ヵ月	36ヵ月	36ヵ月
規制区分	創薬	創薬	創薬

項目	リベルサス錠 3mg	リベルサス錠 7mg	リベルサス錠 14mg
服用方法	1日1回	1日1回	1日1回
服用タイミング	空腹時に服用	空腹時に服用	空腹時に服用
飲水量	約120mL以下	約120mL以下	約120mL以下
服用後の注意	服用後30分は飲食を避ける	服用後30分は飲食を避ける	服用後30分は飲食を避ける
服用忘れした場合	その日は服用せず翌日に服用	その日は服用せず翌日に服用	その日は服用せず翌日に服用